



PRUEBAS GENERALES

Guía de Recursos para la Atención Sanitaria y Alfabetización en Salud a
Personas Refugiadas y Migrantes en Andalucía

Febrero 2024

- **Hemograma, recuento y fórmula.** Se pretende la detección de:
 - Anemias y Hemoglobinopatías
 - Anemia falciforme.
 - Talasemia.
 - Eosinofilia periférica.

- **Bioquímica básica:** Perfil básico, hepático y renal. Estudio de déficits nutricionales como hierro y vitaminas. Estudio tiroideo y dislipemias.

- **Sistemático de orina:** Descartar esquistosomiasis ante hallazgo de hematuria y eosinofilia.

- **Estudio de parásitos en heces:** Esencial en la detección de parasitosis intestinales:
 - Su indicación depende de si procede de una zona de alto riesgo, del tiempo de estancia en nuestro país o si aparece eosinofilia.
 - Se recomienda su realización de forma rutinaria a todo migrante procedente del continente africano, con estancia inferior a 3 años.
 - Se recomienda estudiar al menos 3 muestras de días consecutivos.

- **Test de la tuberculina (PPD/Mantoux)/IGRA y Radiografía de tórax:** Búsqueda de casos de enfermedad tuberculosa activa para un diagnóstico precoz y valoración de la infección latente.

- Para los casos de personas que hayan podido vivir situaciones de hacinamiento que dificulten el mantenimiento de unas buenas condiciones de higiene se recomienda tener presente las **infestaciones por escabiosis y pediculosis.**

- **Serología:**

GENERALES

Enfermedad	Prueba	Observaciones
Sífilis	Serología	- > 15 años o menor con: Historia de actividad sexual o abuso sexual Antecedente materno de infección Posibilidad de infección por otras trepanomatosis no venéreas. - Cribado en mayores de 15 años en todos los casos
Hepatitis A		- Investigar estado de vacunación en población adulta para determinar si es necesario vacunar, por la alta prevalencia de infección pasada en estas edades

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si no hepatitis pasada ▪ En caso de patología hepática ▪ Prácticas de riesgo ▪ Viajes a país de origen
Hepatitis B	Serología (AntiHBc, AgHBs, AntiHBs)	<ul style="list-style-type: none"> - Si infección actual, HBeAg o carga viral - Si cumple criterios de inmunización y no hay evidencia de vacunación previa se recomienda realizar serología AntiHBs
Hepatitis C	Serología	<ul style="list-style-type: none"> - Si positivo, estudio carga viral y genotipo
VIH	Serología (VIH-1 y VIH-2) Consentimiento previo	
Sarampión, Rubeola, Parotiditis (TV) y Varicela (VVZ)	Serología	
ITS	Cribado completo	<ul style="list-style-type: none"> - Prácticas sexuales de riesgo - Abusos - Antecedentes ITS previas